

TS-1副作用チェックシート

抗がん剤名															
年月日															
服用期間	コース 日目					コース 日目					コース 日目				
体重															
体表面積															
検査値															
用法・用量															
併用薬															
副作用について	評価					評価					評価				
悪心	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
嘔吐	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
食欲不振	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
倦怠感	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
口内炎	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
下痢	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
末梢神経障害	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
脱毛	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
感染症(発熱)	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
手足症候群	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
色素沈着	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
出血(鼻血・歯肉出血等)	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
ざ瘡様皮疹	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
爪症状	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
涙目	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
服用アドヒアランス	□良好 □やや良好 □不良					□良好 □やや良好 □不良					□良好 □やや良好 □不良				
備考															

※病院に緊急連絡が必要な症状 (連絡方法は患者様にお渡ししております)

- ・38℃以上の発熱が続き、解熱しない時
- ・吐き気や口内炎のため24時間以上水分も取れない時
- ・水様の下痢が治療前に比較して1日5～6回以上ある時
- ・顔面が紅潮して、呼吸がゼーゼーする時